

<b>FICHA ESPECIES EXOTICAS INVASORAS</b>		<b>junio 2008 / Ficha nº 7</b>
<b>ESPECIE</b>	<i>Threskhiornis aethiopicus</i>	
<b>NOMBRE COMÚN</b>	Ibis sagrado	
<b>ORIGEN</b>	África subsahariana, Irak y Madagascar.	
<b>DESCRIPCIÓN</b>		
<p>Alcanza una longitud de 65 a 80 cm. con una extensión en las alas de 115 a 125 cm. El peso es de unos 1.5 kg. La cabeza y el cuello lo tiene desprovisto de plumas, la piel es negra. El pico es negro, largo, arqueado hacia abajo y relativamente robusto si lo comparamos con el de otros ibis. El plumaje es blanco excepto por la punta de las plumas primarias en las alas y las plumas ornamentales que le crecen en la parte posterior del cuerpo. Las patas son largas y al igual que los pies, son negras.</p>		
<b>LOCALIZACIÓN</b>	P.N. de "El Hondo" y P. N. de las Salinas de Santa Pola.	
<b>FECHA</b>	Primera observación en Alicante el 19 de noviembre de 2007. Observadores Carlos Gutiérrez y Marcos Ferrández.	
<b>COMUNICADO POR</b>	Centro de Recuperación de Fauna Santa Faz.	
<b>ORIGEN SUPUESTO</b>	Escapados de cautividad.	
<b>CITAS PREVIAS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA</b>	<p>Ninguna. Pequeña población, con un máximo de 18 aves entre 1983 y 1985 en libertad en el Zoológico de Barcelona (X. Batllori y D. Bigas, com.pers.), sin evidencias de que sea autosuficiente. En 2001 se comprobó todavía su reproducción. Existen también datos de reproducción desde 1997 en Canarias (Martín &amp; Lorenzo, 2001). En Francia existe un núcleo reproductor en el litoral oeste, formado por unas 150 pp. en 1996 (Dubois <i>et al.</i>, 2000). Algunos de los ejemplares que se observan en España pueden proceder de esta población.</p>	
<b>POTENCIAL INVASOR</b>	Depreda sobre pollos de aves acuáticas, principalmente en colonias de larolimícolas.	
<b>ACTUACIONES</b>	Se abate un ejemplar el 2 de mayo de 2008.	
<b>IMÁGENES:</b> ejemplar abatido en el medio natural.		