




Barranc de la Safor

Orden de declaración	DOCV nº 6450 (pág. 4796 - 4797) de 1 de febrero de 2011 http://www.docv.gva.es/datos/2011/02/01/pdf/2011_969.pdf				
Modificada en Orden	DOCV nº 7328 (pág. 18860) de 30 de julio de 2014 http://www.docv.gva.es/datos/2014/07/30/pdf/2014_7130.pdf				
Municipio	Villalonga	Comarca	La Safor	Provincia	Valencia
Superficie	0,40 ha	Altitud	195 - 245 m	UTM	30SYJ3806, YJ3906
Titularidad	Dominio Público Hidráulico				
Litología	Dolomías		Sector corológico	Setabense	
Termoclima	Termomediterráneo		Ombroclima	Húmedo	
Espacio Protegido / Red Natura 2000	LIC Serra de la Safor (ES5233041) Paisaje Protegido del Serpis				
Localización / Acceso	https://goo.gl/maps/xkVdSXaKMCuhHW2X8				





Número de especies de flora vascular: 103

Flora protegida (P)¹, endémica (E) o rara (R)

Anarrhinum laxiflorum (P, R)
Arenaria aggregata subsp. *pseudoarmeriastrum* (E, R)
Arenaria valentina (E)
Biscutella stenophylla subsp. *stenophylla* (E)
Centaurea aspera subsp. *stenophylla* (E)
Centaureum quadrifolium subsp. *barrelieri* (E)
Chaenorhinum crassifolium subsp. *crassifolium* (E)
Elaoselinum tenuifolium (E)
Erysimum gomezcampoii (E)
Guillonea scabra (E)
Iberis carnosia subsp. *hegelmaieri* (E)

Leucanthemum gracilicaule (E)
Pimpinella propinqua (E, R)
Pteris vittata (P, R)
Reseda valentina (E)
Rhamnus lycioides (E)
Satureja obovata subsp. *valentina* (E)
Selaginella denticulata (R)
Teucrium buxifolium subsp. *buxifolium* (E, R)
Teucrium ronnigeri subsp. *ronnigeri* (E)
Thymus piperella (E)
Thymus vulgaris subsp. *aestivus* (E)
Trisetum velutinum (E, R)



Pteris vittata es un helecho muy raro en la flora valenciana, incluido en el Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas en la categoría de especies *Vulnerables*.



Inflorescencia de *Anarrhinum laxiflorum*, la otra especie protegida presente en la microreserva.

¹La calificación "protegida" hace referencia a las especies incluidas en la Orden 6/2013.
http://www.dogv.gva.es/datos/2013/04/04/pdf/2013_3166.pdf



Tipos de hábitats (Código Natura 2000)

- Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del *Molinio-Holoschoenion* (6420).
- Galerías y matorralles ribereños termomediterráneos (*Nerio-Tamaricetea* i *Securinegion tinctoriae*) (92D0).

Plan de gestión

http://www.docv.gva.es/datos/2011/02/01/pdf/2011_969.pdf



Vegetación del interior del barranco donde se mezclan las formaciones de adelfa (*Nerium oleander*), varios arbustos como la zarza (*Rubus ulmifolius*) y los pinos carrascos (*Pinus halepensis*).

Acciones adicionales de conservación

- Desbroce anual de las formaciones de zarza (*Rubus ulmifolius*) con el objetivo de mejorar el estado de conservación de la población de *Pteris vittata*.



Comentarios

En esta microrreserva se encuentra una de las mejores poblaciones valencianas de la especie protegida *Pteris vittata*. También se pueden observar ejemplares de una de las pocas poblaciones valencianas conocidas de *Anarrhinum laxiflorum*. Además, incluye también algunas especies endémicas y raras, como *Arenaria aggregata* subsp. *pseudoarmeriastrum*, *Arenaria valentina*, *Elaeoselinum tenuifolium*, *Iberis carnososa* subsp. *hegelmaieri*, *Pimpinella propinqua*, *Teucrium buxifolium* subsp. *buxifolium* o *Trisetum velutinum*.

Bibliografía

- Güemes, J., E. Carrión, P. Blasco & J.E. Oltra (2011). *Anarrhinum laxiflorum* Boiss. (Scrophulariaceae), una especie nueva para la flora valenciana. *Flora Montiberica* 47: 107-113.
- Oltra, J.E. & A. Navarro (2009). Algunes plantes noves o poc citades per a la comarca de la Safor. *Toll Negre* 11: 114-118.