




Passet de la Rabosa

Orden de declaración	DOGV nº 4390 (pág. 30398 - 30399) de 2 de diciembre de 2002 http://www.dogv.gva.es/datos/2002/12/02/pdf/2002_13219.pdf				
Municipio	Benifato	Comarca	La Marina Baixa	Provincia	Alicante
Superficie	18,29 ha	Altitud	1280 - 1545 m	UTM	30SYH3881, YH3981
Titularidad	Ayuntamiento de Benifato				
Litología	Calcáreas, calcarenitas y margas		Sector corológico	Setabense	
Termoclima	Supramediterráneo		Ombroclima	Subhúmedo	
Espacio Protegido / Red Natura 2000	LIC Aitana, Serrella i Puigcampana (ES5213019)				
Localización / Acceso	https://goo.gl/maps/fWy9EAy4Xaa7A2oY7				





Número de especies de flora vascular: 115

Flora protegida (P)¹ endémica (E) o rara (R)

<i>Aethionema marginatum</i> (R)	<i>Iberis saxatilis</i> subsp. <i>saxatilis</i> (R)
<i>Alyssum montanum</i> (R)	<i>Jasione foliosa</i> (E, R)
<i>Arenaria aggregata</i> subsp. <i>aggregata</i> (R)	<i>Leucanthemum arundanum</i> (P, R)
<i>Armeria alliacea</i> subsp. <i>alliacea</i> (E)	<i>Linaria cavanillesii</i> (E, R)
<i>Berberis hispanica</i> subsp. <i>hispanica</i> (P, R)	<i>Lonicera pyrenaica</i> (P, R)
<i>Biscutella rosularis</i> (E, R)	<i>Ononis aragonensis</i> (R)
<i>Brassica repanda</i> subsp. <i>maritima</i> (E)	<i>Onopordum acaulon</i> (R)
<i>Bufoia perennis</i> subsp. <i>tuberculata</i> (E, R)	<i>Ornithogalum bourgaeum</i> (R)
<i>Campanula hispanica</i> (E, R)	<i>Paronychia kapela</i> (R)
<i>Centaurea boissieri</i> subsp. <i>mariolensis</i> (E)	<i>Paronychia suffruticosa</i> (E)
<i>Centaurea rouyi</i> subsp. <i>rouyi</i> (E)	<i>Phyllitis scolopendrium</i> (P, R)
<i>Centranthus angustifolius</i> subsp. <i>lecoqii</i> (R)	<i>Polygonatum odoratum</i> (R)
<i>Chaenorhinum crassifolium</i> subsp. <i>crassifolium</i> (E)	<i>Potentilla caulescens</i> (R)
<i>Conopodium thalictrifolium</i> (E, R)	<i>Prunus prostrata</i> (R)
<i>Cotoneaster granatensis</i> (P, E, R)	<i>Pseudoscabiosa saxatilis</i> (E)
<i>Crepis albida</i> subsp. <i>scorzoneroides</i> (E, R)	<i>Rhamnus alpinus</i> (R)
<i>Cuscuta approximata</i> (R)	<i>Rhamnus saxatilis</i> subsp. <i>infectoria</i> (R)
<i>Daphne oleoides</i> subsp. <i>hispanica</i> (R)	<i>Rumex scutatus</i> (R)
<i>Dianthus saetabensis</i> subsp. <i>contestanus</i> (E, R)	<i>Salvia lavandulifolia</i> subsp. <i>mariolensis</i> (E, R)
<i>Erodium saxatile</i> (E, R)	<i>Saxifraga corsica</i> subsp. <i>cossoniana</i> (E)
<i>Erysimum gomezcampoii</i> (E)	<i>Saxifraga cuneata</i> subsp. <i>paniculata</i> (E, R)
<i>Festuca gautieri</i> (R)	<i>Saxifraga longifolia</i> (P, R)
<i>Festuca lambinonii</i> (R)	<i>Scabiosa turolensis</i> (E)
<i>Festuca plicata</i> (P, R)	<i>Scrophularia tanacetifolia</i> (E)
<i>Fumana procumbens</i> (R)	<i>Senecio minutus</i> (R)
<i>Genista longipes</i> (P, E, R)	<i>Seseli montanum</i> subsp. <i>granatense</i> (P, E, R)
<i>Geranium robertianum</i> (R)	<i>Silene mellifera</i> (E)
<i>Helianthemum dianicum</i> (E)	<i>Silene saxifraga</i> (R)
<i>Helianthemum organifolium</i> subsp. <i>saetabense</i> (E)	<i>Sisymbrium crassifolium</i> subsp. <i>laxiflorum</i> (E)
<i>Helichrysum pendulum</i> subsp. <i>fontanesii</i> (E, R)	<i>Sorbus aria</i> (R)
<i>Hieracium amplexicaule</i> (R)	<i>Taxus baccata</i> (P, R)
<i>Hieracium aragonense</i> (E, R)	<i>Teucrium botrys</i> (R)
<i>Hieracium bourgaei</i> (R)	<i>Teucrium buxifolium</i> subsp. <i>buxifolium</i> (E, R)
<i>Hieracium laniferum</i> (E, R)	<i>Teucrium ronnigeri</i> subsp. <i>ronnigeri</i> (E)
<i>Hordeum murinum</i> subsp. <i>murinum</i> (R)	<i>Teucrium thymifolium</i> (E)
<i>Hormatophylla spinosa</i> (R)	<i>Thymus serpylloides</i> subsp. <i>gadorensis</i> (P, E, R)
<i>Iberis carnosae</i> subsp. <i>hegelmaieri</i> (E)	<i>Vella spinosa</i> (P, E, R)

¹ La calificación "protegida" hace referencia a las especies incluidas en la Orden 6/2013.
http://www.dogv.gva.es/datos/2013/04/04/pdf/2013_3166.pdf



Seseli montanum subsp. *granatense* (izquierda) es un endemismo de las sierras béticas, que forma parte de las comunidades de pequeños arbustos pulvinulares de zonas elevadas venteadas. *Berberis hispanica* subsp. *hispanica* (derecha) es un arbusto que forma parte de espinares de la media-alta montaña mediterránea.

Tipos de hábitats (Código Natura 2000)(Hábitat prioritario*)

- Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos (5330).
- Prados calcáreos cársticos o basófilos del *Alyso-Sedion albi* (6110*).
- Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica (8210).
- Bosques mediterráneos de *Taxus baccata* (9580*).

Plan de gestión

http://www.dogv.gva.es/datos/2002/12/02/pdf/2002_13219.pdf



Vista de la microrreserva, en la que se observan las diferentes unidades de vegetación prioritarias.



Acciones adicionales de conservación

- Instalación de panel interpretativo de los hábitats y las especies representativas de la microrreserva.
- Colonización asistida de *Phyllitis scolopendrium*.
- Instalación de vallados de exclusión de ganado para evitar el ramoneo de ejemplares de *Cotoneaster granatensis*.

Comentarios

La fuerte relación con la flora de las sierras béticas más meridionales se pone de manifiesto por la presencia de táxones propios de matorrales pulvinulares de media-alta montaña, que tienen su límite septentrional en la sierra de Aitana, representando un gran valor biogeográfico y de conservación. Entre estos orófitos béticos cabe mencionar *Berberis hispanica* subsp. *hispanica*, *Cotoneaster granatensis*, *Genista longipes*, *Leucanthemum arundanum*, *Seseli montanum* subsp. *granatense*, *Thymus serpylloides* subsp. *gadorenensis* o *Vella spinosa*.